

**على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:**  
**الموضوع الأول**

\* التمرين الأول: (4.5 نقاط)

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة :  $z^2 = -2 + 2i\sqrt{3}$  و أكتب الحلول على الشكل الأسّي
2. المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{u}; \vec{v})$  نعتبر النقط  $A, B, C, D$  لواحقها:  
أح أنشئ النقط  $A, B, C, D$   
ب) أكتب العدد المركب  $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C}$  على الشكل الأسّي، ثم إستنتج طبيعة المثلث  $ABC$   
ج) عيّن مركز و نصف قطر الدائرة  $(C)$  المحيطة بالمثلث  $ABC$
3. يبين أن العدد  $\left(\frac{z_A}{2}\right)^{2018} \times \left(\frac{z_B}{2}\right)^{1439} \times \left(\frac{z_D}{2}\right)^{1954}$  حقيقي.
4. لتكن  $(E)$  مجموعة النقط  $M$  ذات اللاحقة  $z$  حيث:  $(z - z_A)(\bar{z} - z_D) = z_B \cdot \bar{z}_B$   
أح عيّن طبيعة المجموعة  $(E)$  مع تحديد عناصرها المميزة.  
ب) عيّن صورة  $(E')$  صورة  $(E)$  ب التحاكي  $h$  الذي مركزه  $A$  و نسبته  $-2$
5. لتكن  $(\Gamma)$  مجموعة النقط  $M$  ذات اللاحقة  $z$  حيث:  $\arg(i(\bar{z} - z_A)) = \frac{\pi}{2} + k\pi$  حيث  $(k \in \mathbb{Z})$   
- عيّن طبيعة المجموعة  $(\Gamma)$ .

\* التمرين الثاني: (4.5 نقاط)

- يحتوي صندوق  $U_1$  على 4 كرات مرقمة ب: 1، 1، 2، 2 و يحتوي صندوق  $U_2$  على 5 كرات مرقمة ب: 1، 1، 2، 2، 3 نعتبر أن جميع الكرات متماثلة و لا يمكن التمييز بينها باللمس. نسحب كرة واحدة من الصندوق  $U_1$  و نسحب في آن واحد كرتين من الصندوق  $U_2$
1. أحسب احتمال الحوادث التالية:  
الحادثة  $A$ : الحصول على 3 كرات تحمل نفس الرقم  
الحادثة  $B$ : من بين الكرات المسحوبة توجد على الأقل كرتين تحملان الرقم 2.  
الحادثة  $C$ : جداء الأعداد التي تحملها الكرات الثلاثة يساوي 6.
  2. ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكرات المسحوبة التي تحمل الرقم 1  
أح عيّن قانون الإحتمال للمتغير العشوائي  $X$  و أحسب أمله الرياضي  
ب) أحسب التباين و الإبحراف المعياري للمتغير العشوائي  $X$ .

✱ التمرين الثالث: (4 نقاط)

$$\begin{cases} U_1 + 2U_2 + U_3 = 100 \\ U_1 \times U_3 = 256 \end{cases} : q \text{ و أساسها } U_1 \text{ حدّها الأول} \text{ (I) } (U_n) \text{ متتالية هندسية متزايدة تماما، حدودها موجبة تماما، حدّها الأول } U_1 \text{ و أساسها } q$$

1. أحسب كل من  $U_1$ ،  $U_2$ ،  $U_3$  و الأساس  $q$ ، ثم تحقق أن  $U_n = 4^n$ .
  2. أحسب بدلالة  $n$  كل من المجموع:  $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$  و الجداء  $P_n = U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$
- (II) 1. أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي القسمة الإقليدية لـ  $5^n$  على 7
2. يبين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$ :  $19^{6n+9} + 2^{6n+4} + 50^{3n+2} - 5^{6n+4} \equiv 0 [7]$
  3. نضع من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم:  $S'_n = \frac{1}{\ln 2} [\ln 4 + \ln 4^2 + \dots + \ln 4^n]$
- أحسب  $S'_n$  بدلالة  $n$ ، ثم عيّن قيم العدد الطبيعي  $n$  بحيث يكون:  $S'_n + 3n^2 - n - 5^{2018} \equiv 0 [7]$

التمرين الرابع: (7 نقاط)

(I) نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  ب:  $g(x) = x^2 - 1 - 2 \ln(x)$

1. أدرس تغيرات الدالة  $g$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

2. إستنتج إشارة  $g(x)$  على المجال  $]0; +\infty[$

(II) نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  ب:  $f(x) = x + \frac{1 - (\ln x)^2}{x}$

( $C_f$ ) المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  (وحدة الطول 1cm)

1. أ) أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا

ب) برهن أن:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ ، ثم إستنتج  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

2. أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  لدينا:  $f'(x) = \frac{g(x) + (\ln x)^2}{x^2}$

ب) أحسب  $f'(1)$ ، ثم إستنتج إتجاه تغير الدالة  $f$  و شكل جدول تغيراتها.

ج) إستنتج أن ( $C_f$ ) يقبل نقطة إنعطاف يطلب تعيين إحداثيها.

3. أ) أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$  و فسر النتيجة هندسيا.

ب) أدرس الوضع النسبي لـ ( $C_f$ ) بالنسبة إلى مستقيمه المقارب المائل ( $\Delta$ ).

4. أ) يبين أن المنحنى ( $C_f$ ) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها  $\alpha$  حيث:  $0.3 < \alpha < 0.4$

ب) أنشئ ( $\Delta$ ) و ( $C_f$ ).

5. أ) أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى ( $C_f$ ) و المستقيمتين التي معادلاتها:  $y = x$ ،  $x = 1$  و  $x = \lambda$

حيث  $\lambda$  عدد حقيقي أكبر تماما من  $e$

ب) عيّن قيمة العدد الحقيقي  $\lambda$  بحيث:  $S(\lambda) = \frac{4}{3} \text{ cm}^2$

## الموضوع الثاني


### \* التمرين الأول: (5 نقاط)

1. حل في مجموعة الأعداد المركبة  $\mathbb{C}$  المعادلة ذات المجهول المركب  $z$  الآتية:  $(z-3)(z^2-4z+13)$
2. المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس  $(O; \vec{u}; \vec{v})$   
 نعتبر النقط  $A, B, C, D$  لواحقها:  $z_A = i, z_B = 3, z_C = 2 - 3i, z_D = 2 + 3i$  على الترتيب.  
 أ) أكتب العدد المركب  $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$  على الشكل الأسّي، ثم إستنتج طبيعة المثلث  $ABC$ .  
 ب) أكتب العبارة المركبة للتشابه  $S$  الذي مركزه  $A$  و يحول  $B$  إلى  $C$ ، ثم حدّد نسبته وزاويته
3. أ) عيّن المجموعة  $(\Gamma)$  للنقط  $M(z)$  من المستوي بحيث:  $\arg(z - z_A)^2 = 2 \arg(z_A) + \arg(z - z_B)^2$   
 ب) عيّن طبيعة المجموعة  $(\Gamma')$  صورة  $(\Gamma)$  بالتحويل  $S$  مع تحديد عناصرها المميزة.
4. نعرف متتالية النقط  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$  كما يلي:  $A_{n+1} = S(A_n)$  و  $z_0 = 1 + i$  حيث  $(z_n)$  لاحقة النقطة  $(A_n)$   
 أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n: z_n = (1 - i)^n + i$   
 ب) عيّن قيم  $n$  الطبيعية حتى تنتمي النقط  $A_n$  إلى المستقيم  $(AD)$ .

### \* التمرين الثاني: (4 نقاط)

- (I) نعتبر في  $\mathbb{Z}^2$  المعادلة:  $5x - 6y = 3 \dots (1)$
1. بيّن أنه إذا كانت الثنائية  $(x; y)$  حلا للمعادلة (1) فإن  $x$  مضاعف للعدد 3.
2. حل في  $\mathbb{Z}^2$  المعادلة (1)، ثم عيّن الأعداد الصحيحة  $b$  بحيث:  $\begin{cases} b \equiv -1 [6] \\ b \equiv -4 [5] \end{cases}$
- (II) 1. أدرس حسب قيم العدد الطبيعي  $n$  بواقي القسمة الإقليدية للعدد  $2^n$  على 9
2. بيّن أنه إذا كانت الثنائية  $(x; y)$  حلا للمعادلة (1) حيث  $x$  و  $y$  عددين طبيعيين، فإن العدد:  $2^{2017} \times 3 - 4^{3y} - 2^{x-1}$  مضاعف للعدد 9.
- (III)  $A$  و  $B$  عددان طبيعيين حيث:  $A$  يكتب  $\overline{1a0a00^3}$  في النظام ذي الأساس 3 و  $B$  يكتب  $\overline{\alpha\beta0\alpha^5}$  في النظام ذي الأساس 5  
 - عيّن  $\alpha$  و  $\beta$  حتى تكون الثنائية  $(A; B)$  حل للمعادلة (1).

### \* التمرين الثالث: (4 نقاط)



نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $]-2; +\infty[$  كما يلي:

$$f(x) = x - \ln(x + 2)$$

$(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد

و المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  و المستقيم  $(\Delta)$  ذا المعادلة  $y = x$

1. أحسب  $f(-1)$  ثم بقراءة بيانية حدّد إتجاه تغير الدالة  $f$

2. نعرف المتتالية العددية  $(U_n)$  المعرفة على  $\mathbb{N}$  كما يلي:

$$U_{n+1} = f(U_n) \quad \text{و} \quad U_0 = 3$$

أ) أنقل الشكل المقابل، ثم مثل على حامل محور الفواصل

الحدود  $U_0, U_1, U_2, U_3$  (دون حساب الحدود)

- ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية  $(U_n)$  و تقاربها إطلاقاً من التمثيل السابق

2. أ بـ برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n : U_n \geq -1$

ب) يبين أن  $(U_n)$  متناقصة تماماً، ثم إستنتج أنها متقاربة و أحسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

3. نعتبر المتتالية العددية  $(V_n)$  المعرفة بمجدها الأول  $V_0 = 0$  و من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم:

$$V_n = \ln [(U_0 + 2)(U_1 + 2) \times \dots \times (U_{n-1} + 2)]$$

أ بـ يبين أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n : V_n = 3 - U_n$

ب) إستنتج  $\lim_{n \rightarrow +\infty} [(U_0 + 2)(U_1 + 2) \times \dots \times (U_{n-1} + 2)]$

التمرين الرابع: (7 نقاط)

(I) نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $g(x) = (2x + 1)e^x - 1$

1. أدرس تغيرات الدالة  $g$ ، ثم شكل جدول تغيراتها.

2. أحسب  $g(0)$ ، ثم إستنتج إشارة  $g(x)$  على  $\mathbb{R}$

(II) نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ  $f(x) = x(1 - e^{-x})^2$

$(C_f)$  المنحنى الممثل للدالة  $f$  في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$  (وحدة الطول  $1cm$ )

1. أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

2. أ بـ أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$  و فسر النتيجة هندسياً.

ب) أدرس الوضع النسبي لـ  $(C_f)$  بالنسبة إلى مستقيمه المقارب المائل  $(\Delta)$ .

3. أ بـ يبين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  لدينا:  $f'(x) = (e^{-x} - 1)g(-x)$

ب) إستنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  و شكل جدول تغيراتها.

4. أ بـ أكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة  $0$

ب) أدرس الوضع النسبي لـ  $(C_f)$  بالنسبة إلى المماس  $(T)$

ج) إستنتج أن  $(C_f)$  يقبل نقطة إنعطاف يطلب تعيين إحداثياتها،

د) أنشئ  $(\Delta)$ ،  $(T)$  و  $(C_f)$ .  $(f(-\frac{5}{4}) \approx -7.75)$

5. ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد و إشارة حلول المعادلة:  $f(x) = mx$

6. أ بـ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x : 2f(x) + 3f'(x) + f''(x) = 3 + 2x - 2e^{-x} - e^{-2x}$

ب) أحسب  $S$  مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى  $(C_f)$  و المستقيمت التي معادلاتها:  $y = x$ ،  $x = 0$  و  $x = 1$

إتتهى الموضوع الثاني