

4 :

اختبار في مادة الرياضيات

على كل مترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين .

التمرين الأول: ( 04 )

5 ويكتب  $\overline{bbab}^8$

$\overline{abcca}^5$  عدد طبيعي غير معدوم يكتب

(1) بين أن  $N$  يحقق :  $309a + 15c = 226b$  .8

(2) بين أن العدد 3  $.b$

(3) فيما يلي نفرض :  $b = 3$  .

( بين أن ،  $309(a - 2) = 60 - 15c$  )

$.c \quad a$

(  $(a - 2)$  5 )

.10

$N$

التمرين الثاني: ( 04 )

$I \quad B, A$

$(O, \vec{u}, \vec{v})$

لواحقها على الترتيب ،  $z_A = -2$  ،  $z_B = -1 + i$  ،  $z_I = i$

حيث  $z \neq -2$  :  $z' = \frac{iz + i + 1}{z + 2}$

$.z'$

$M' \quad z$

حيث  $M$

( -1 ) :  $z' = \frac{i(z + 1 - i)}{z + 2}$

( بين أنه إذا كانت النقطة  $M$

(C) يطلب

$M'$

$[AB]$

تعيين عناصرها .

( عين طبيعة (E)  $M(z)$  المستوي بحيث يكون  $z'$  تخيلا .

( -2 ) :  $z' - i = \frac{1 - i}{z + 2}$

(  $IM \times AM = \sqrt{2}$  :  $(\vec{u}, \overline{IM'}) + (\vec{u}, \overline{AM}) \equiv -\frac{f}{4}[2f]$  )

$M'$

1

$A$

( $\Gamma$ )

( بين أنه إذا كانت النقطة  $M$

إلى مجموعة يطلب تعيينها .

$.z_E = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

$E$

-3

( بين أن النقطة  $E$  ( $\Gamma$ ) ثم بين أن  $(\vec{u}, \overline{AE}) \equiv \frac{f}{3}[2f]$  )

$.E$

$E'$

(2

)

التمرين الثالث ( 05 )

نعتبر المتتالية العددية  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  :  $u_0 = \frac{1}{5}$  ومن أجل كل عدد طبيعي  $n$   $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2u_n + 1}$

1- تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$   $u_{n+1} = 1 - \frac{1}{2u_n + 1}$

2- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$   $0 < u_n < \frac{1}{2}$

تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$   $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(1 - 2u_n)}{2u_n + 1}$  ثم بين أن المتتالية  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  متزايدة

هل  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  متقاربة؟ عين نهايتها .

3- نضع من أجل كل عدد طبيعي  $n$  :  $v_n = \frac{3^n u_n}{2u_n - 1}$

أثبت أن المتتالية  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  هندسية أساسها  $q = 6$  .

$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$   $u_n = \frac{2^n}{3 + 2^{n+1}}$   $n$   $v_n$  (

التمرين ا ( 07 ) :

I. نعتبر الدالة العددية  $g(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} - \ln(e^x + 1) : \mathbb{R}$

وليكن  $(C_g)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  .

(1)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$  وفسر النتيجة هندسيا  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  .

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$   $g'(x) = \frac{-e^{2x}}{(e^x + 1)^2}$  ثم استنتج اتجاه تغير الدالة  $g$  وشكل جدول تغيراتها

(3) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$   $g(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} - \ln(1 + e^{-x}) - x$

(4)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - (-x + 1)]$  ثم فسر النتيجة هندسيا .

(5)  $(C_g)$   $(\Delta)$

(6)  $g(x)$  عندما يتغير  $x$   $\mathbb{R}$  .

II.  $f(x) = e^{-x} \ln(e^x + 1) : \mathbb{R}$  الدالة العددية المعرفة على المجموعة

(1) برهن أن  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$   $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  .

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$   $f'(x) = e^{-x} \times g(x)$  ثم استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  وشكل جدول تغيراتها

(3) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$   $\frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}$   $\int_{-\ln 3}^0 \frac{1}{e^x + 1} dx :$

(4)  $\int_{-\ln 3}^0 f(x) dx$

التمرين الأول ( 04 )

$r$  عدد حقيقي موجب تماما و  $\theta$  عدد حقيقي حيث  $\theta \in [0; f]$ .

$$z_2 = \sqrt{3}(1+i) \quad z_1 = r^2(\sin\theta + i\cos\theta) \quad z_0 = r(-\cos\theta + i\sin\theta) :$$

$$z_2 \quad z_1, z_0 \quad (1)$$

( 2 ) عين العددين الحقيقيين  $r$   $\theta$  بحيث يكون :  $z_1 = \bar{z}_0$ .

( 3 ) عين عندئذ قيم العدد الطبيعي  $n$  بحيث يكون العدد  $\left(\frac{z_0}{z_1}\right)^n$  حقيقيا .

$$\theta = \frac{\pi}{3} \quad r = 1 \quad (3)$$

C B,A (O,  $\vec{u}, \vec{v}$ )

لواحقها :  $z_2, z_1, z_0$  على الترتيب .

( عين  $z_G$  )  $G$   $\{(A;2), (B;2), (C,-1)\}$

( عين طبيعة  $(\Gamma)$  )  $M$  من المستوي حيث ،  $\|2\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC}\| = 3$

التمرين الثاني : ( 04 )

$$(E): 5x - 6y = 3 \quad : \quad \mathbb{Z}^2$$

1- ( أثبت أنه إذا كانت الثنائية  $(x, y)$  (E)  $x$  (E) 3

(E)  $\mathbb{Z}^2$  (E) (E)

$$\begin{cases} x \equiv -1[6] \\ x \equiv -4[5] \end{cases} : (S)$$

2-  $a$   $b$  عدنان طبيعيان حيث :

$$a = \overline{1r0r00} \quad 3 \quad b = \overline{rs0r}$$

• عين  $r$   $s$  حتى تكون الثنائية  $(a; b)$  (E) .

التمرين الثالث ( 04 )

B(6;1;5), A(3;-2;2) (O,  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ )

$$(P): x + y + z - 3 = 0 \quad C(6; -2; -1)$$

(1) برهن أن المثلث ABC .

(2) برهن أن المستوي (P) عمودي على المستقيم (AB) ويمر من النقطة A.

(3) أكتب معادلة ديكرتية للمستوي (P') (AC) A

(4) أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم  $(\Delta)$  مستقيم تقاطع كلا من المستويين (P) (P')

(5) (D(0;4;-1) بين أن المستقيم (AD) (ABC) (

.ABCD (

( بين أن قيس الزاوية  $\widehat{BDC}$  هو  $\frac{\pi}{4}$  rad .

( BDC ثم استنتج المسافة بين النقطة A (BDC)

التمرين الرابع: (08)

I. نعتبر الدالة العددية f :  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  :  $f(x) = x - (x^2 + 1)e^{-x+1}$  .  
(C<sub>f</sub>) f (O,  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$ )

-1 (  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  وبيّن أن :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

( بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x  $f'(x) = 1 + (x-1)^2 e^{-x+1}$  .  
( استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها .

-2 ( بين أن المستقيم  $(\Delta)$   $y = x$   $(C_f)$   $(\Delta)$  .

-3 ( بيّن  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  حيث ،  $1.8 < \alpha < 1.9$  .

-4 ( أكتب معادلة ديكرتية للمماس (T)  $(C_f)$  .1

-5 ( بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x  $f''(x) = -(x-1)(x-3)e^{-x+1}$   $(C_f)$  يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيينهما .

-6 (  $f(3), f(0)$   $(\Delta)$  (T)  $(C_f)$  .

-7 ( ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة طول المعادلة ذات المجهول الحقيقي x التالية :  
(E) :  $f(x) = x + m$

II. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n  $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x+1} dx$  .

-1 ( بيّن أن الدالة G هي دالة أصلية للدالة  $x \mapsto xe^{-x+1}$  :  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  :  $G(x) = -(x+1)e^{-x+1}$  .  
( I<sub>1</sub> )

-2 ( باستعمال الكاملة بالتجزئة بين أن :  $I_{n+1} = -1 + (n+1)I_n$  لكل عدد طبيعي غير معدوم n .  
( I<sub>2</sub> )

-3 ( الحيز المستوي المحدد بالمنحني  $(C_f)$  و المستقيم  $(\Delta)$  والمستقيمين الذين معادلتيهما :  
cm<sup>2</sup>  $x=1$   $x=0$  .

مع تمنياتكم بالتوفيق والنجاح في البكالوريا جوان 2014