


اختبار في مادة الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

التمرين الأول : (04 نقاط)

الفضاء منسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس المباشر $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، متوازي مستطيلات حيث ،



$$\vec{AE} = 3\vec{k} \text{ و } \vec{AD} = 4\vec{j}, \vec{AB} = 2\vec{i}$$

$$(1) \text{ أ) تحقق أن : } \vec{AG} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$$

ب) عين إحداثيي الشعاعين \vec{EG} و \vec{EB}

ج) أكتب معادلة ديكراتية للمستوي (EBG) .

(2) ليكن α عدد حقيقي يختلف عن 1 و $M(2\alpha; 4\alpha; 3\alpha)$ نقطة من الفضاء .

أ) تحقق أن النقطة M تنتمي الى المستقيم (AG) باستثناء النقطة G .

ب) بين أن النقطة M لا تنتمي الى المستوي (EBG) .

(3) ليكن V حجم رباعي الوجوه $MEBG$.

أ) عبر عن V بدلالة α .

ب) أحسب حجم رباعي الوجوه $AEBG$.

ج) من أجل أية قيمة للعدد الحقيقي α ، يكون V مساويا لحجم متوازي المستطيلات $ABCDEFGH$.

التمرين الثاني : (04.5 نقاط)

(1) حل في مجموعة الاعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة ذات المجهول المركب z التالية : $(z^2 + 3)(z^2 - 6z + 21) = 0$

(2) في المستوي المركب المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس المباشر (O, \vec{u}, \vec{v}) ، نعتبر النقط A, B, C, D و لواحقتها

$$\text{على الترتيب } z_D = \overline{z_C} \text{ و } z_C = 3 + 2i\sqrt{3}, z_B = \sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{2}}, z_A = \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}$$

بين أن النقط A, B, C, D و تنتمي الى نفس الدائرة (C) التي مركزها Ω ذات اللاحقة $z_\Omega = 3$ يطلب تعيين نصف قطرها .

(3) لتكن النقطة E نظيرة النقطة D بالنسبة الى المبدأ O .

أ) بين أن : $\frac{z_C - z_B}{z_E - z_B} = e^{-i\frac{\pi}{3}}$ ثم استنتج طبيعة المثلث BEC .

ب) بين أنه يوجد دوران R مركزه النقطة B ويحول النقطة E الى النقطة C . يطلب تعيين زاويته .

(4) نعتبر التحويل النقطي S الذي يرفق بكل نقطة M ذات اللاحقة z النقطة M' ذات اللاحقة z' حيث ،

$$z' + i\sqrt{3} = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}(z + i\sqrt{3})$$

أ) عين طبيعة S وعناصره المميزة .

(ب) عين طبيعة (E) مجموعة النقط M من المستوي ذات اللاحقة z و التي تحقق : $z = 3 + 2\sqrt{3}e^{i\theta}$ حيث θ عدد حقيقي .

(ج) عين طبيعة (E') صورة (E) بالتحويل S وعناصرها الهندسية .

التمرين الثالث (04.5 نقطة)

لتكن $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ متتالية هندسية متزايدة حدودها موجبة معرفة على المجموعة \mathbb{N}^* بـ :

$$\begin{cases} u_1 + 2u_2 + u_3 = 100 \\ u_1 \times u_3 = 256 \end{cases}$$

(1) أحسب u_1, u_2, u_3 ثم عين أساس المتتالية q .

(2) عبر عن عبارة الحد العام u_n بدلالة n .

(3) أحسب بدلالة n كلا من المجموع : $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ و الجداء $P_n = u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n$

(4) أ) ادرس تبعا لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الاقليدية للعدد 7^n على 5 .

ب) عين باقي القسمة الاقليدية للعدد $3 - 5n + 49^{2n+1} + 2016^{1436}$ على 5 .

ج) نضع من اجل كل عدد طبيعي n غير معدوم : $S_n' = \frac{1}{\ln 2} [\ln 4 + \ln 4^2 + \dots + \ln 4^n]$

- أحسب S_n' بدلالة n ثم عين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون : $S_n' + 4n^2 + 7^{4n} \equiv 0 [5]$

التمرين الرابع : (07 نقاط)

I. نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجموعة \mathbb{R}^* بـ : $g(x) = 2x^2 + 1 - \ln|x|$

(1) ادرس تغيرات الدالة g .

(2) استنتج اشارة $g(x)$ على \mathbb{R}^* .

II. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R}^* بـ : $f(x) = 2x - 2 + \frac{\ln|x|}{x}$

نسمي (C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس (O, \vec{i}, \vec{j}) (الوحدة 2cm)

(1) أحسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف .

(2) أحسب $f'(x)$ وشكل جدول تغيرات الدالة f .

(3) بين أن المستقيم $y = 2x - 2$: (Δ) مقارب مائل للمنحني (C_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$ ثم ادرس الوضع النسبي

للمنحني (C_f) بالنسبة الى (Δ) .

(4) احسب $f(-x) + f(x)$. ماذا تستنتج بالنسبة للمنحني (C_f) ؟

(5) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 1 و الآخر α حيث $-0.4 < \alpha < -0.3$.

(6) أرسم (Δ) و (C_f) .

III. ليكن λ عدد حقيقي حيث $\lambda > 1$.

(1) أحسب بدلالة λ و بـ cm^2 المساحة $A(\lambda)$ للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) و المستقيم (Δ) و المستقيمين

الذين معادلتيهما $x = \lambda, x = 1$.

(2) عين قيمة العدد الحقيقي λ بحيث يكون : $A(\lambda) = 2cm^2$.

الموضوع الثاني

التمرين الاول : (04.5 نقاط)

في الفضاء منسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس المباشر $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $C(3;2;1), B(1;2;0), A(3;1;0)$ و $D(0;0;m)$ حيث m عدد حقيقي موجب .

(1) أ) أحسب الجداء السلمي $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$ ثم استنتج القيمتين المضبوطتين لكل من $\cos \widehat{ABC}$ و $\sin \widehat{ABC}$.
ب) أحسب مساحة المثلث ABC .


(2) بين أن الشعاع $\vec{n}(1;2;-2)$ ناظمي للمستوي (ABC) ثم استنتج معادلة ديكارتية له .

(3) بين أن $ABCD$ رباعي وجوه وأن حجمه $V_{ABCD} = \frac{2m+5}{6}$.

(4) لتكن (S_m) مجموعة النقط $M(x; y; z)$ من الفضاء والتي تحقق: $x^2 + y^2 + z^2 - 2mz + m^2 - 9 = 0$.
بين أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب m فإن (S_m) سطح كرة يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها .

(5) عين قيمة m حتى يكون (ABC) مستوي مماس لسطح الكرة (S_m) .

(6) أكتب معادلة للمستوي (P) الموازي تماما للمستوي (ABC) ويمس (S_m) .



التمرين الثاني: (04.5 نقطة)

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد

$$\begin{cases} u_0 = 11 \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n - 2} + 2 \end{cases} \quad \text{طبيعي } n \geq 0$$

(1) أ) باستعمال المنحني (C_f) الممثل للدالة f المرفقة

بالمتتالية (u_n) والمعرفة بالعلاقة $f(x) = \sqrt{x-2} + 2$ و المنصف الاول ذي المعادلة $y = x$ ، مثل الحدود

u_0, u_1, u_2, u_3 على محور الفواصل .

ب) ما هو تخمينك لاتجاه تغير المتتالية (u_n) ؟

(2) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $3 \leq u_n \leq 11$.

(3) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n - 2}(1 - \sqrt{u_n - 2})$.

(4) بين أن المتتالية (u_n) متناقصة .

(5) استنتج مما سبق أن المتتالية (u_n) متقاربة و عين نهايتها .

(6) أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 \leq u_{n+1} - 3 \leq \frac{1}{2}(u_n - 3)$.

ب) استنتج أن: $0 \leq u_n - 3 \leq 8 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ من أجل كل عدد طبيعي n ، ثم عين نهاية المتتالية (u_n) .

التمرين الثالث : (04.5 نقاط)

- (1) حل في مجموعة الأعداد المركبة C المعادلة ذات المجهول z حيث: $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$.
(2) أكتب الحلول على الشكل المثالي .

(3) نعتبر في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس (O, \vec{u}, \vec{v}) النقط A ، B و C التي لواحقها على

$$\text{الترتيب } z_C = -\sqrt{3} - i \text{ و } z_B = \overline{z_A} \text{ ، } z_A = \sqrt{3} + i$$

(أ) عين z_D لاحقة النقطة D حتى يكون الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع

(ب) أكتب على الشكل الأسّي الأعداد المركبة z_A ، z_B و z_C

(ج) عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون العدد $\left(\frac{z_A}{2}\right)^n \times \left(\frac{z_B}{2}\right)^n \times \left(\frac{z_C}{2}\right)^n$ حقيقي .

(4) ليكن التحويل النقطي S الذي بكل نقطة M ذات اللاحقة z النقط M' ذات اللاحقة z' حيث $z' = (1 - i\sqrt{3})z - \sqrt{3} + 3i$
(أ) عين طبيعة التحويل S و أعط عناصره المميزة .

(ب) بين أن المجموعة (Γ) للنقط M و التي تحقق $(z - z_A)\overline{(z - z_A)} = z_C \cdot \overline{z_C}$ هي دائرة يطلب تعيين مركزها و نصف قطرها

(ج) عين المجموعة (Γ') صورة (Γ) بالتحويل S و أعط عناصرها المميزة .

التمرين الرابع : (06.5 نقطة)

I. نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$

(1) أدرس تغيرات الدالة g .

(2) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

II. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجموعة \mathbb{R} بـ : $f(x) = e^{-x} \ln(e^x + 1)$

نسمي (C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس (O, \vec{i}, \vec{j}) .

(1) أحسب نهايتي الدالة f عند $-\infty$ (يمكن وضع $f(x) = \frac{\ln(e^x + 1)}{e^x}$) وعند $+\infty$. فسر النتيجة هندسيا .

(2) (أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = e^{-x} \times g(e^x)$ ،

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها .

(3) أرسم المنحني (C_f) .

(4) (أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) + f(x) = 1 - \frac{e^x}{e^x + 1}$

(ب) عين دالة أصلية F للدالة f على المجموعة \mathbb{R} والتي تنعدم من أجل القيمة 0 .

(ج) أحسب وبوحدة المساحات cm^2 المساحة S للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) و محور الفواصل و المستقيمين

الذين معادلتيهما : $x = \ln 2$ ، $x = 0$.

🌟 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق و النجاح في البكالوريا جوان 2015 🌟 أساتذة المادة